

Aldactone

SPIRONOLACTONE

طفلك وأمراض القلب

www.aubmc.org



AMERICAN UNIVERSITY of BEIRUT MEDICAL CENTER
المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت

كلنا سلامة صحتكم

الجامعة الأميركية في بيروت
المركز الطبي
صندوق البريد: ٢٣٦١١١
رياض الصلح، بيروت ٢٠٢٠ ١١٠٧
بيروت - لبنان

ما هو هذا الدواء؟

هو دواء مدر للبول يمنع الجسم من امتصاص الكثير من الملح ويحافظ على مستوى البوتاسيوم.

كيفية الاستخدام:

يؤخذ عن طريق الفم مع الطعام.

الدواء متوفر في الأشكال التالية:

• شراب 5 mg/ml

يمكن أن يحضر في صيدلية مستشفى الجامعة الأميركية أو في صيدليات أخرى.



يستعمل دوماً المكيال الخاص لإعطاء الدواء ولا تستعمل ملعقة الطعام العادية.

• حبة 25 mg



يمكن تذويب الحبة في الماء وإعطائها حسب التعليمات المعطاة.

ماذا تفعل في حال نسيت إعطاء الجرعة:

إذا كان وقت الجرعة التالية بعد أقل من ٤ ساعات، يجب عدم إعطاء الطفل جرعة إضافية والاكتهاف بالجرعة القادمة. أما إذا كان الوقت الفاصل أكثر من ٤ ساعات، فيجب إعطاء طفلك الجرعة الناقصة في أقرب وقت ممكن. لا تعط أبداً جرعة مضاعفة.

عوارض جانبية محتملة:

- دوخة خفيفة
- ألم في المعدة
- ألم في الرأس

إتصل بالطبيب فوراً إذا اشتكى الطفل من:

- عوارض الحساسية للدواء وهي طفح جلدي، وصعوبة في التنفس، وتورم في الوجه أو اللسان.
- عوارض إرتفاع معدّل البوتاسيوم وهي عدم إنتظام دقات القلب، وشعور بالوخز في الأصابع، وألم في العضلات.
- عدم القدرة على التبول.
- إسهال حاد أو عدم القدرة على تناول السوائل.

إرشادات عامة:

- أحرص على إعطاء طفلك كمية كافية من السوائل إذ يزيد الدواء من احتمال إصابة الطفل بالجفاف.
- تجنّب نظاماً غذائياً غنياً بالملح فكثرة الملح تؤدي إلى امتلاء جسم طفلك بالماء وبالتالي إلى تخفيف مفعول الدواء.
- هذا الدواء يمكن أن يؤثر على نتائج اختبارات طبيّة معينة. لذلك، من الأفضل أن تخبر أي طبيب يعالج طفلك أنه يتناول هذا الدواء.

أخبر الطبيب إذا كان الطفل:

- يعاني من أمراض في الكلى أو الكبد.
- يعاني من حساسية لأي دواء آخر.
- يتناول أي أدوية أخرى.

دواعي الإستعمال:

- المحافظة على مستوى البوتاسيوم في الجسم
- التخلص من الماء الزائد في الجسم