

Aspirin

طفلك وأمراض القلب

www.aubmc.org



AMERICAN UNIVERSITY of BEIRUT MEDICAL CENTER

المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت

كلنا سلامة صحتكم

ما هو هذا الدواء؟

هو من مجموعة مثبّطات صفائح الدم، يعمل على الحدّ من تخثر الدم وخطر الجلطات في الجسم.

كيفية الاستخدام:

- يؤخذ عن طريق الفم.
- الدواء متوفر في الأشكال التالية:
- حبة 81 mg
- حبة 100 mg
- يمكن أن تذوّب الحبة في الماء.
- يفضل تناول الدواء بعد الطعام.

ماذا تفعل في حال نسيت إعطاء الجرعة:

إذا كان وقت الجرعة التالية بعد أقل من ٤ ساعات، يجب عدم إعطاء الطفل جرعة إضافية والاكْتفاء بالجرعة القادمة. أما إذا كان الوقت الفاصل أكثر من ٤ ساعات، فيجب إعطاء طفلك الجرعة الناقصة في أقرب وقت ممكن. لا تعطِ أبداً جرعة مضاعفة.

عوارض جانبية محتملة:

- ألم في المعدة

إتصل بالطبيب فوراً إذا اشتكى الطفل من:

- عوارض الحساسية للدواء وهي طفح جلدي، وصعوبة في التنفس، وتورّم في الوجه واللسان.
- عوارض نزيف داخلي وهي براز أسود، ودم في السعال أو القيء، وألم شديد في المعدة.

إرشادات عامة:

- أخبر طبيب الأسنان أو أي طبيب آخر يعالج طفلك أنه يتناول هذا الدواء.
- هذا الدواء يزيد من احتمال حدوث نزيف، لذا إحرص على تجنّب طفلك الجروح والإصابات وتأكد من استعماله فرشاة أسنان لينة.
- لا توقف هذا الدواء قبل إبلاغ الطبيب مهما كانت الأسباب.

أخبر الطبيب إذا كان الطفل:

- يعاني من أمراض في الدم، قرحة في المعدة، أمراض في الكبد والكلية.
- يعاني من حساسية ضدّ أي دواء آخر.
- يتناول أي أدوية أخرى.
- بحاجة إلى عملية جراحية لكي يرشد الطبيب كيفية توقيف الدواء.

دواعي الإستعمال:
• الحدّ من خطر التعرّض لجلطات الدم