

Lasix
FUROSEMIDE

طفلك وأمراض القلب

www.aubmc.org



AMERICAN UNIVERSITY of BEIRUT MEDICAL CENTER
المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت

كلنا سلامة صحتكم

الجامعة الأميركية في بيروت
المركز الطبي
صندوق البريد: ٢٣٦١١١
رياض الصلح، بيروت ٢٠٢٠ ١١٠٧
بيروت - لبنان

ما هو هذا الدواء؟

هو دواء يساعد على التخلص من الماء والملح الزائد عن طريق الكلى.

كيفية الاستخدام:

يؤخذ عن طريق الفم.
الدواء متوفّر في الأشكال التالية:
• حبة 40 mg



• شراب 1 mg/ml يمكن أن يحضّر في صيدلية مستشفى الجامعة الأميركية أو في صيدليات أخرى.



يستعمل المكيال الخاص لإعطاء الدواء ولا تستعمل ملعقة الطعام العادية.

• 20 mg/2ml Ampoule



تؤخذ الجرعة اللازمة عن طريق الفم.

إلتزم دوماً بالجرعة المحددة من قبل الطبيب.

ماذا تفعل في حال نسيت إعطاء الجرعة:

إذا كان وقت الجرعة التالية بعد أقل من 4 ساعات، يجب عدم إعطاء الطفل جرعة إضافية والاكْتفاء بالجرعة القادمة. أما إذا كان الوقت الفاصل أكثر من 4 ساعات، فيجب إعطاء طفلك الجرعة الناقصة في أقرب وقت ممكن. لا تعط أبداً جرعة مضاعفة.

عوارض جانبية محتملة:

- دوخة خفيفة
- ألم في المعدة
- إمساك: أكثر من إعطاء طفلك الألياف والسوائل
- ألم في الرأس

إتصل بالطبيب فوراً إذا اشتكى الطفل من:

- عوارض نقص البوتاسيوم وهي تخدير في الأصابع، وتشنّج في العضلات، وعدم انتظام دقات القلب.
- عوارض الحساسية للدواء وهي طفح جلدي، وصعوبة في التنفس، وورم في الفم واللسان.
- عدم القدرة على التبول.
- إسهال حادّ أو عدم القدرة على تناول السوائل.

إرشادات عامة:

- أحرص على إعطاء طفلك كمية كافية من السوائل إذ يزيد الدواء من احتمال إصابة الطفل بالجفاف.
- قلل من تعرّض طفلك المباشر لأشعة الشمس إذ يزيد الدواء من احتمال إصابة الطفل بحروق الشمس.

أخبر الطبيب إذا كان الطفل:

- يعاني من أمراض في الكلى أو الكبد.
- يتناول أي أدوية أخرى.
- يعاني من حساسية ضدّ أيّ دواء آخر.

إلتزم دوماً بتعليمات الطبيب.

دواعي الإستعمال:

- تقليص عبء العمل على عضلة القلب في حالات قصور القلب الاحتقاني
- ارتفاع ضغط الدم
- التخلص من الماء الزائد في الجسم